

ATRAZADOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Atrazina..... 500 g/L
GRUPO QUIMICO	Triazina
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1320 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCION	ATRAZADOR es un herbicida sistémico que afecta la formación de clorofila y carotenoides, con la cual inhibe la fotosíntesis y destruye membranas celulares provocando en conjunto la muerte de las malezas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Caña de Azúcar	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	0.6-0.8	-	60	0.1
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>ATRAZADOR se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y agitar continuamente. Aplicar en suelos que tengan adecuada humedad y tengan capacidad de campo. Usar boquilla de abanico de un ángulo de aplicación entre 80 y 140 grados, cuidando de no afectar a cultivos aledaños.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar previa evaluación, en malezas que tengan entre 2 a 4 hojas verdaderas y turgentes. - Como máximo 1 campaña/año, a una dosis máxima de 1.6 L/ha. - De persistir las malezas, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO	No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	ATRAZADOR compatible con la mayoría de plaguicida, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>