

BARBARO

HERBICIDA AGRÍCOLA


CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Butachlor..... 600 g/L
GRUPO QUÍMICO	Chloroacetamide
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 815 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso.Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCION	BARBARO es un herbicida selectivo, pre emergente eficaz en control de malezas gramíneas, ciperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha en el cultivo de arroz. Es absorbido por los brotes germinales y por las raíces, se transloca a toda la planta por el xilema.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Arroz	“ Grama dulce” “Coquito” “Moco de pavo” “Pata de gallina” “Correhuela” “Verdolaga”	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Cyperus difformis</i> <i>Echinochloa colona</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Ipomoea quinquefolia</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1.5 - 2	3-4	90	0.1

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Arroz de trasplante: Aplicar BARBARO la primera semana después del trasplante antes que emerjan las malezas, aplique preferiblemente con una pequeña lámina de agua.</p> <p>Siembra directa: Aplicar BARBARO después de la siembra de arroz antes que emerjan las malezas; se recomienda tener pozas bien preparadas, niveladas y con una lamina de agua permanente.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Realizar como máximo una aplicación por campaña por año.</p> <p>En siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.</p> <p>En arroz transplante, aplicar el producto cuando el arroz tenga tres días de transplante y antes de la emergencia de las malezas.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	BARBARO es compatible con los agroquímicos y adyuvantes más comúnmente usados.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>