

BIZONTE

HERBICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Bispyribac sodium..... 400 g/L
GRUPO QUÍMICO	Ácido Pirimidil Oxibenzoico
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada(SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1963 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	BIZONTE es un herbicida post emergente de acción sistémica perteneciente al grupo de los Pirimidinil carboxy, para el control de las malezas indicadas en el cuadro de usos. Inhibe la actividad enzimática de la ALS (acetolactato sintetasa) bloqueando la biosíntesis de varios aminoácidos esenciales para el crecimiento de las plantas dando como resultado la muerte de la maleza.


CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Arroz	Coquito Gramma dulce Moco de pavo	<i>Cyperus difformis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Echinochloa crus-galli</i>	-	0.1	60	0.02

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>BIZONTE es un herbicida cuya aplicación se realiza en la época de crecimiento vegetativo del arroz (aproximadamente 25 -30 días de postsiembra) y post emergencia de las malezas (3 -4 hojas).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Se recomienda una aplicación por campaña.
PERIODO DE REINGRESO	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de plaguicidas. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.
FITOTOXICIDAD	BIZONTE no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>