

# CAÑAMEX

HERBICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Herbicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Ametrina..... 500 g/L
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Triazina
<b>FORMULACIÓN</b>	Suspensión Concentrada (SC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA Nº 1269 - SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>CAÑAMEX</b> es un herbicida sistémico selectivo que se utiliza para el control en pre y pos emergencia de un amplio espectro de hoja ancha y gramínea en el cultivo de caña de azúcar. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Es absorbido por vía foliar y radicular. Su translocación es acropétala por el xilema y se acumula en los ápices meristemáticos. Su modo de acción es la inhibición de la fotosíntesis, particularmente en la cadena de transporte de electrones.

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Caña de Azúcar	Amor seco Pata de gallina Rabo de zorro Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1	2	30	0.25

**P.C.:** Período de carencia

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado. <b>CAÑAMEX</b> es fácil de preparar, verter la dosis recomendada en agua y obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Se debe realizar las aplicaciones antes de la emergencia de las malezas. Aunque los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana por su activo crecimiento y mayor sensibilidad de la maleza. Se recomienda realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos aledaños.</p>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>CAÑAMEX</b> es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)                  CISPROQUIM: 0800-50847                  SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>