

FURIOSO

HERBICIDA AGRÍCOLA

| | |
|-----------------------------------|---|
| CLASE | Herbicida Agrícola |
| INGREDIENTE ACTIVO | Cyhalofop butyl..... 180 g/L |
| GRUPO QUÍMICO | Aryloxyphenoxypropionate |
| FORMULACIÓN | Concentrado emulsionable (EC) |
| DISTRIBUIDOR | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| N° REGISTRO | PQUA N° 2012-SENASA |
| TITULAR DE REGISTRO | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| TOXICIDAD | Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado |
| MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN | FURIOSO es un herbicida foliar post-emergente para control selectivo de las malezas específicas en arroz, solo las de crecimiento activo. Es rápidamente absorbido por la planta, se mueve por el floema y se acumula en los meristemos. |

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | MALEZA | | DOSIS | P.C. días | L.M.R. ppm |
|---------|--|--|-------|--------------|---------------|
| | Nombre común | Nombre científico | L/ha | | |
| Arroz | "Cadillo" "Grama" "Grama dulce" "Moco de pavo" "Pata de gallina" | <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Leptochloa uninervia</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Echinichloa cruz-galli</i> <i>Eluesine indica</i> | 1 | 60 | 0.01 |

P.C. Periodo de carencia

L.M.R: Límite Máximo de Residuos

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO | <p>Aplicar con los equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.</p> <p>-Después de usar este producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p> |
| FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN | <p>Realizar una aplicación por campaña/año, luego de la emergencia de las malezas.</p> |

| | |
|--|---|
| PERIODO DE REINGRESO | No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación. |
| COMPATIBILIDAD | FURIOSO es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. |
| FITOTOXICIDAD | No es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados. |
| MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS | <p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div> |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | <p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p> |