

PRECIADO 440 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA


CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Chlorothalonil 400 g/L Metalaxyl-M 40 g/L
GRUPO QUIMICO	Cloronitrilo + Phenylamide
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
N° REGISTRO	PQUA N° 1029 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	<p>PRECIADO 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos.</p> <p>PRECIADO 440 SC contiene en su formulación 2 ingredientes: chlorothalonil y metalaxyl-M los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga. El chlorothalonil que impide germinación de las células de hongos y el Metalaxyl-M inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.</p> <p>PRECIADO 440 SC es un fungicida de baja toxicidad para mamíferos, pero de alta efectividad en el control de hongos fitopatógenos.</p>

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.5	14	0.5* 2**
Papa	Hielo (ranchar)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	3.0	7	0.02* 0.05**

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos *Chlorothalonil **Metalaxyl-M

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar PRECIADO 440 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. - Aplicar PRECIADO 440 SC como máximo una vez por campaña, considerando dos campañas al año para los cultivos de cebolla y papa.
PERIODO DE REINGRESO	No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD	PRECIADO 440 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD	PRECIADO 440 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>