

SECAPLUS

HERBICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Dicloruro de paraquat..... 276 g/L
GRUPO QUÍMICO	Bipiridilos
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
NºREGISTRO	Nº PQUA 1808 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	CIPAGRO S.A.C
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	SECAPLUS es un herbicida post-emergente, de contacto, no selectivo, recomendado para el control de diversas malezas anuales y perennes. Actúa formando superóxidos que desintegran las membranas celulares y los tejidos de la planta.

CUADRO DE USOS


CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha		
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento, piquillo, páprika)	MALEZAS ANUALES		2 - 3*	30	0.02
	Moco de pavo Pata de gallina Verdolaga Amor seco Cerraja Yuyo hembra Yuyo macho	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Amaranthus caudatus</i>			
	MALEZAS PERENNES				
	Grama china Grama dulce	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>			

P.C. Periodo de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

* No usar una concentración mayor a 2L/cilindro.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>-Se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. No aplicar con equipos manuales de gota controlada de Ultra bajo volumen (unidades CDA), pulverizadoras a motor o atomizadoras.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar en post-emergencia de malezas. Realizar como máximo una aplicación por campaña al año.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.
COMPATIBILIDAD	Es incompatible con materiales alcalinos, surfactantes aniónicos y materiales inertes que contengan arcilla. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.
FITOTOXICIDAD	SECAPLUS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>