

# YURAK 250 EC

<b>FUNGICIDA AGRÍCOLA</b>
---------------------------


<b>CLASE</b>	Fungicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Propiconazole..... 250 g/L
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Triazoles
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado Emulsionable (EC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>N° REGISTRO</b>	PQUA N° 796 – SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	SHARDA PERU S.A.C.
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Amarillo</b> Moderadamente peligroso. Dañino
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<p><b>YURAK 250EC</b> es un fungicida que tiene acción sistémica y puede ser utilizado en forma preventiva protegiendo al cultivo antes de contraer la enfermedad, o curativo, evitando el desarrollo del patógeno, incluso cuando se observen los primeros signos o síntomas de la enfermedad.</p> <p><b>YURAK 250 EC</b> ejerce su acción sobre el hongo patógeno en el estadio de la formación del primer haustorio, deteniendo el desarrollo del mismo a través de la interferencia de la biosíntesis de esteroides de las membranas celulares.</p>

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C días	L.M.R ppm
	Nombre común	Nombre técnico	L/200L	L/ha		
Espárrago	“Roya”	<i>Puccinia asparagi</i>	0.15	0.3	30	0.05

P.C.: Periodo de carencia    L.M.R: Límite Máximo de Residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p><b>YURAK 250 EC</b> se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua. Utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de la enfermedad usar la dosis máxima por hectárea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.</p> <p>Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.</p>
<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	<p>Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto.</p>
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<p><b>YURAK 250 EC</b> es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.</p>

<b>FITOTOXICIDAD</b>	No se ha observado síntomas de toxicidad a la dosis recomendada en la etiqueta.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847 t          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>