

CAÑAMEX

HERBICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Ametrina..... 500 g/L
GRUPO QUIMICO	Triazina
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1269 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	CAÑAMEX es un herbicida sistémico selectivo que se utiliza para el control en pre y pos emergencia de un amplio espectro de hoja ancha y gramínea en el cultivo de caña de azúcar. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Es absorbido por vía foliar y radicular. Su translocación es acropétala por el xilema y se acumula en los ápices meristemáticos. Su modo de acción es la inhibición de la fotosíntesis, particularmente en la cadena de transporte de electrones.


CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Caña de Azúcar	Amor seco Pata de gallina Rabo de zorro Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1	2	30	0.25

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado. CAÑAMEX es fácil de preparar, verter la dosis recomendada en agua y obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Se debe realizar las aplicaciones antes de la emergencia de las malezas. Aunque los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana por su activo crecimiento y mayor sensibilidad de la maleza. Se recomienda realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos aledaños.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	CAÑAMEX es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>