

GALÁCTICO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

| | |
|-----------------------------------|--|
| CLASE | Insecticida Agrícola |
| INGREDIENTES ACTIVOS | Fipronil.....400 g/Kg Imidacloprid.....400 g/Kg |
| GRUPO QUÍMICO | Phenylpyrazole + Neonicotinoide |
| FORMULACIÓN | Gránulos Dispersables (WG) |
| DISTRIBUIDOR | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| Nº REGISTRO | PQUA Nº 2148 – SENASA |
| TITULAR DE REGISTRO | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| TOXICIDAD | Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino |
| MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN | GALACTICO es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. |

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|----------|--------------------------|------------------------------|--------|------|----------------|----------------|
| | Nombre común | Nombre científico | g/200L | g/ha | | |
| Arroz | Mosca minadora del arroz | <i>Hydrellia wirthi</i> | - | 100 | 30* 40** | 0.01* 1.5** |
| Cebolla | Thrips | <i>Thrips tabaci</i> | 200 | 400 | 21 | 0.02* 0.1** |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i> | 100 | 200 | 35 | 0.005* 1** |

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos
 *Fipronil **Imidacloprid

| | |
|---|--|
| INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO | <p>Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).</p> <p>Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. |
| FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN | <p>Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.</p> <p>Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, considerando que un porcentaje de brotes dañados mayor al 6% será un momento oportuno para la aplicación del producto. No aplicar en época de floración.</p> |

| | |
|--|---|
| PERIODO DE REINGRESO | No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. |
| COMPATIBILIDAD | Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina. |
| FITOTOXICIDAD | GALACTICO no es fitotóxico a la dosis y uso recomendados. |
| MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS | Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin. |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 |