

GALEON

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Benalaxyl80g/kg Mancozeb650g/Kg
GRUPO QUIMICO	Benalaxyl Phenylamide Mancozeb Dithiocarbamato
FORMULACIÓN	Polvo Mojable (WP)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1973 - SENASA
TITULAR DEL REGISTRO:	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado.
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	GALEON es un fungicida curativo – preventivo a base de benalaxyl y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: fenilamidas y dithiocarbamatos, respectivamente. Tiene acción sistémica y de contacto.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	kg/200L		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	0.4	30	0.2* 1.5**
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.5- 1	45	0.07* 0.3**
Tomate	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5	-	15	0.5* 3**
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.5	66	0.3* 1.5**

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuo

Benalaxyl *Mancozeb **

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregue GALEON según cuadro de dosis y usos. Disolver previamente GALEON en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña, una campaña al año en los cultivos de cebolla, papa, tomate y vid.</p> <p>Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.
COMPATIBILIDAD	GALEON es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, evitar el contacto con ácidos y oxidantes fuertes.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222