

GRAMACIL

HERBICIDA AGRÍCOLA


CLASE	Herbicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Clethodim..... 125 g/L
GRUPO QUÍMICO	Cyclohexanedioneoxima
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
NºREGISTRO	PQUA Nº1468 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	SHARDA PERÚ S.A.C.
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCION	GRAMACIL es un herbicida selectivo post emergente. Es recomendado para el control de las malezas indicadas en el cuadro de usos. Se absorbe y se traslada fácilmente desde el follaje a las raíces y partes en crecimiento de la planta. Es un inhibidor de la síntesis de lípidos, evita la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la integridad de las membranas celulares, afectando así el crecimiento de las plantas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>	0.5	0.75	45	0.5
Espárrago	“Gramma dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	0.75	-	1	1.7

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Se debe disolver previamente GRAMACIL, en un recipiente con agua, mezclar homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Las aplicaciones se deben realizar cuando las malezas hayan alcanzado 10 cm de alto. Realizar como máximo una aplicación por hectárea/campaña/año.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	GRAMACIL es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD	No presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>