

RANCHERO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTES ACTIVOS	Mancozeb.....640 g/Kg Metalaxyl.....80 g/Kg
GRUPO QUIMICO	Carbamato y Phenylamide
FORMULACIÓN	Polvo Mojable(WP)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº2257 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	<p>RANCHERO es un fungicida sistémico de amplio espectro, con actividad protectora y curativa, se recomienda la aplicación tempranamente para evitar la acumulación de la enfermedad.</p> <p>RANCHERO es una mezcla de dos fungicidas de diferentes modos de acción:</p> <p>Metalaxyl es del grupo de las fenilamidas, se absorben rápidamente en el tejido de la planta y son trasladadas acropetalmente dentro de la planta.</p> <p>Mancozeb pertenece al grupo de los ditiocarbamatos y actúa por contacto sobre los hongos fitopatógenos.</p>

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil 200 L		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.8-1	45	0.5* 0.2**
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	2	-	15	3.0* 2.5**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara vitícola</i>	2	-	66	2.0* 1.5**

P.C.: Período de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos *Metalaxyl **Mancozeb

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Disolver previamente RANCHERO en un balde con agua, mezclar hasta que la mezclasea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Agregue RANCHERO según el cuadro de dosis y usos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
--------------------------------------	--

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. - Usar la dosis más alta a mayor presión de la enfermedad. - Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones. - En los cultivos de papa, tomate y vid, realizar una aplicación por campaña/año.
PERIODO DE REINGRESO	No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911</p>