

# SPINAB

## 150 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Insecticida Agrícola
<b>INGREDIENTES ACTIVOS</b>	Spinosad..... 120 g/L Abamectina..... 30 g/
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Espinosinas; Avermectinas
<b>FORMULACIÓN</b>	Suspensión concentrada (SC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA 1318-SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	SHARDA PERU S.A.
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>SPINAB 150 SC</b> actúa por contacto e ingestión, pero principalmente su acción es por ingestión. <b>SPINAB 150 SC</b> brinda un excelente control sobre <i>Heliothis virescens</i> , tiene un efecto sinérgico sobre la actividad de la acetilcolina y sobre la proteína del receptor GABA, provocando sobreexcitación del sistema nervioso, causando parálisis no reversible y finalmente la muerte.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Gusano del capullo del pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.1	7	0.3* 0.02**

**P.C.:** Período de carencia  
 \*Spinosad\*\*Abamectin

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.</p> <p>Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 2 campaña por año.</p> <p>Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, considerando que un porcentaje de brotes dañados mayor al 6% será un momento oportuno para la aplicación del producto. No aplicar en época de floración.</p>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>SPINAB 150 SC</b> es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de ácidos y álcalis fuertes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño
<b>FITOTOXICIDAD</b>	<b>SPINAB 150 SC</b> no es fitotóxico a la dosis y uso recomendados.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>