

TanKing

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTES ACTIVOS	Cymoxanil.....80g/kg Mancozeb.....640 g/kg
GRUPOS QUÍMICOS	Cymoxanil: Cianocetamidas – oximes Mancozeb: Dithiocarbamato
FORMULACIÓN	Polvo Mojable (WP)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
N° REGISTRO	PQUA N° 400 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	<p>TANKING es un fungicida curativo – preventivo a base de cymoxanil y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: cianoacetamidas-oximas y dithiocarbamatos, respectivamente.</p> <p>TANKING tiene acción sistémica y de contacto.</p>
-----------------------------------	--

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C días	L.M.R Ppm
	Nombre común	Nombre científico	Kg/cil200L	Kg/ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.45 – 0.5	-	7	0.05* 1.0**
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 0.75	-	8	0.2* 2.5**
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 0.75	-	7	0.01* 0.3**
Pimiento	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.4	-	7	0.05* 5**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2 – 2.5	28	0.2* 1.5**

P.C.: Período de carencia
*Cymoxanil ** Mancozeb

LMR: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregue TANKING según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente TANKING en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.</p>
PERIODO DE REINGRESO	<p>No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.</p>
COMPATIBILIDAD	<p>Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.</p>
FITOTOXICIDAD	<p>No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.</p>
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS	<p>Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p> ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita) </p>